



## ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению  
лекарственного препарата

## Сульфацил натрия

Регистрационный номер: ЛС-001909

Торговое название : Сульфацил натрия

Международное непатентованное название: сульфацетамид

Химическое название: N - [(аминофенил) сульфонил] ацетамид (в виде натриевой соли)

[Сульфацил натрия: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



**Лекарственная форма:** капли глазные

**Состав на 1 мл**

*Активное вещество:*

сульфацетамид ..... - 200 мг

*Вспомогательные вещества:*

натрия тиосульфат ..... - 1 мг

хлористоводородная кислота (1 М раствор хлористоводородной кислоты) - до pH 8,5

вода для инъекций - до 1 мл

**Описание**

Прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость.

**Фармакотерапевтическая группа:** противомикробное средство – сульфаниламид.

**Код АТХ:** S01AB04

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Противомикробное бактериостатическое средство, сульфаниламид. Механизм действия обусловлен конкурентным антагонизмом с парааминобензойной кислотой и угнетением дигидроптероатсинтетазы, нарушением синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных кокков, *Escherichia coli*, *Shigella* spp., *Vibrio cholerae*, *Clostridium perfringens*, *Bacillus anthracis*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Yersinia pestis*, *Chlamydia* spp., *Actinomyces israelii*, *Toxoplasma gondii*.

**Фармакокинетика**

При местном применении максимальная концентрация ( $C_{max}$ ) сульфаниламидов в роговице (около 3 мг/мл), в лагере передней камеры (около 0,5 мг/мл) и радужке (около 0,1 мг/мл) достигается за первые 30 мин после аппликации. Некоторое количество (менее 0,5 мг/мл) сохраняется в тканях глазного яблока в течение 3-4 ч. При повреждении эпителия роговицы пенетрация сульфаниламидов усиливается.

**Показания к применению**

В составе комплексной терапии. Конъюнктивит и блефарит у детей и взрослых, гнойная язва роговицы, профилактика и лечение бленнореи у новорожденных, гонорейные и хламидийные заболевания глаз у взрослых.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Достаточного опыта по применению препарата во время беременности, кормления грудью нет. Возможно применение сульфацетамиды для лечения беременных и кормящих матерей по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

**Способ применения и дозы**

[Сульфацил натрия: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



Местно.

Для лечения конъюнктивита у детей и взрослых, закапывают в конъюнктивальный мешок через каждый час по 1-2 капли, в последующие 3-4 дня – 5-6 раз в день.

Для лечения блефарита у детей и взрослых частота инстилляций в первые дни составляет до 6-8 раз и уменьшается до 3-4 раз в день по мере улучшения состояния, длительность лечения 3-5 дней.

Для лечения гнойной язвы роговицы в составе комплексной терапии в виде инстилляций 5-6 раз в день, в течение 5-7 дней.

С целью профилактики бленнореи у новорожденных по 2 капли в каждый конъюнктивальный мешок непосредственно после рождения и по 2 капли – через 2 часа в течение суток, для лечения бленнореи – в каждый конъюнктивальный мешок по 2 капли каждые 1-2 часа в первые сутки, затем каждые 3 часа, продолжительность лечения две недели.

При лечении гонорейных и хламидийных заболеваний глаз у взрослых в составе комплексной терапии по 1-2 капли 5-6 раз в день, в течение 4-6 недель. При положительной динамике на фоне проводимого лечения число инстилляций капель уменьшают в каждую последующую неделю.

#### **Побочное действие**

Жжение, слезотечение, резь, зуд в глазах, преходящее затуманивание зрения после закапывания, аллергические реакции.

#### **Передозировка**

Данные по передозировке препарата отсутствуют.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Совместное применение с прокаинамидом и тетракаином снижает бактериостатический эффект. Несовместимость с солями серебра.

#### **Особые указания**

Пациенты, обладающие повышенной чувствительностью к фуросемиду, тиазидным диуретикам, сульфонилмочевине или ингибиторам карбоангидразы могут иметь повышенную чувствительность к сульфациламиду. После вскрытия использовать в течение 14 суток.

#### **Способность влиять на скорость реакций при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами**

Если у пациента после применения препарата временно снижается четкость зрительного восприятия, до ее восстановления не рекомендуется управлять автомобилем и заниматься видами деятельности, требующими повышенного внимания и реакции.

#### **Форма выпуска**

Капли глазные 20 %.

По 1 мл, 1,5 мл, 2 мл в тубик-капельницы с клапаном или по 5 мл, 10 мл в тубик-капельницы с винтовой горловиной из полимерных материалов.

Тубик-капельницы с винтовой горловиной укупоривают навинчиваемыми крышками из полимерных материалов.

2 тубик-капельницы по 1 мл, 1,5 мл, 2 мл или 1 тубик-капельницу по 5 мл, 10 мл с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

#### **Условия хранения**

[Сульфацил натрия: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



В защищенном от света месте при температуре от 2 до 15 °С.  
Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата:**

*Владелец регистрационного удостоверения, производитель:*

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский р-н, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятыкова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: <https://www.renewal.ru/>

*Адрес места производства:*

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

*Организация, принимающая претензии от потребителей:*

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: [okk@pfk-obnovlenie.ru](mailto:okk@pfk-obnovlenie.ru)