

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата

АБИСИЛ

Регистрационный номер: Р №003339/02

Торговое название – АБИСИЛ

Международное непатентованное наименование или химическое (группировочное) наименование: Пихты сибирской терпены

Лекарственная форма: раствор для местного и наружного применения (масляный)

СОСТАВ:

Активное вещество: Абисила (Пихты сибирской терпены)
с содержанием борнилацетата 10,0%

- 20,0 г

Вспомогательное вещество: Подсолнечника масло

- до 100 г

ОПИСАНИЕ:

Густая маслянистая жидкость от желтого до молочно-белого цвета со специфическим запахом. При хранении возможно расслоение, исчезающее при встряхивании.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Противовоспалительное средство растительного происхождения

КОД АТХ: [D06BX]

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат оказывает выраженное противовоспалительное, ранозаживляющее, антибактериальное, обезболивающее, антиэкссудативное действие, обусловленное свойствами природных терпеноидов, входящих в его состав. Обладает широким спектром противомикробной активности в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе и к антибиотикоустойчивым штаммам. Создает оптимальные условия для заживления раневой поверхности мягких тканей, ускоряет процесс эпителизации, улучшает микроциркуляцию. При местном применении не всасывается и не оказывает местнораздражающего действия. Препарат не обладает токсическими свойствами, тератогенных, мутагенных и канцерогенных эффектов не выявлено, что позволяет его применять во всех возрастных группах

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

В общехирургической практике: гнойно-воспалительные заболевания кожи и мягких тканей (трофические язвы и длительно незаживающие гнойные послеоперационные и посттравматические раны, свищи, пролежни, ожоги и обморожения, абсцессы и флегмоны, в том числе челюстно-лицевой области).

В стоматологии: стоматиты, пародонтоз, гингивит, альвеолит, осложнения при протезировании зубов.

В оториноларингологии: отит, евстахиит, синусит, ринит, ринофарингит, фарингит, тонзиллит, состояния после тонзиллэктомии, ларингит и т.д.

В дерматологии: рожистое воспаление, пиодермии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Применяют местно, наружно.

При гнойно-воспалительных заболеваниях кожи и мягких тканей предварительно проводят хирургическую обработку раневой поверхности и затем наносят препарат 1 - 2 раза в сутки равномерным тонким слоем. Длительность лечения зависит от формы и тяжести заболевания (обычно 5 – 10 дней) и заканчивается при появлении свежих грануляций, островков эпителия или полной эпителизации.

При воспалительных процессах в челюстно-лицевой области после вскрытия и хирургической обработки абсцессов и флегмон в карманы и послеоперационные раны вводят тампоны, пропитанные раствором Абисила. Процедуру повторяют ежедневно 5 – 7 дней

При заболеваниях полости рта обрабатывать пораженную поверхность слизистой оболочки 2 – 3 раза в день или применять турунды, смоченные препаратом.

При отитах – ввести в наружный слуховой проход тампон, смоченный препаратом.

При лечении ринита, синусита закапывают в каждый носовой ход по 1-2 капли 3-4 раза в день. При гайморитах препарат вводят в гайморову пазуху после ее предварительной санации.

При лечении тонзиллита и других воспалительных заболеваний горла – обрабатывать препаратом слизистые оболочки 2 – 3 раза в сутки.

При заболеваниях кожи – препарат наносят 1 – 3 раза в сутки тонким слоем на пораженные участки. Продолжительность курса индивидуальна и зависит от тяжести заболевания.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Кратковременное жжение в месте нанесения препарата. У лиц с повышенной чувствительностью к эфирным маслам возможны аллергические реакции.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не следует комбинировать с другими наружными средствами.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Перед применением флакон с препаратом необходимо взбалтывать.

Не допускать попадания препарата на конъюнктиву глаза, при попадании достаточно промыть глаз водой.

Не следует наносить на влажную кожу.

ФОРМА ВЫПУСКА

Раствор для местного и наружного применения 20% (масляный). По 5, 10, 15, 20, 30 и 50 мл во флаконы оранжевого стекла. По 15, 20 и 25 мл во флаконы-капельницы из оранжевого стекла. Каждый флакон или флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В сухом, защищенном от света, при температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ

4 года. Не использовать после срока, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ

ОАО «Татхимфармпрепараты», Россия,

420091, г. Казань, ул. Беломорская, 260

(843) тел.571-85-58; факс 571-85-38

E-mail: marketing@tatpharm.ru

ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

ООО «Инитиум-Фарм», Россия

142000, Московская область,

г. Домодедово, Каширское ш., д. 7

тел.: +8 800 234-83-04

www.initium-pharm.com

e-mail:info@initium-pharm.com

Директор ИДКЭЛС

А.Н. Васильев

Генеральный директор

