

Вы решили принимать Полисорб по назначению врача или самостоятельно позаботиться о себе и своей семье, значит эта информация по применению (на основе официальной документации) поможет Вам разобраться в дозировке и способах применения.

ПОЛИСОРБ – «скорая помощь» для всей семьи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПОЛИСОРБ

Полисорб - мощный сорбент нового поколения, основное действующее вещество которого диоксид кремния коллоидный. Препарат эффективен при лечении диареи, отравлений, аллергии, токсикоза, похмельного синдрома и при комплексном очищении организма.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА ПОЛИСОРБ:

- Благодаря обволакивающим свойствам борется с патогенами любых размеров: крупными аллергенами, средними бактериями и мелкими токсинами;
- Облегчает самочувствие уже через 1-4 минуты после приема;
- Сохраняет лечебное действие после перепада температур: не портится в жару, не “боится” мороза багажного отделения самолета (преимущество порошка перед влажными средствами);
- Не содержит добавок: консервантов, красителей, ароматизаторов и подсластителей. Это повышает не только лечебный эффект, но и устраняет риск развития аллергической реакции на примеси;
- Назначается детям с рождения, беременным и кормящим женщинам, пожилым и взрослым людям;
- Допустимо разведение препарата не только в воде, но и в соке, компоте, морсе и грудном молоке.
- Имеет высокий профиль безопасности - более 200 клинических исследований и более 20 лет применения.

ПОЛИСОРБ ПРИНИМАЮТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ:

- остановить **диарею** быстро,
- освободить организм от отравляющих и токсичных веществ при **отравлении**,
- избавиться от проявлений **аллергии** и вывести провоцирующие аллергены,
- снять **похмелье** и его последствия или предотвратить их заранее,
- **очистить** организм от вредных веществ, радионуклидов, тяжелых металлов, поступающих из загрязненной окружающей среды, нездоровых продуктов питания,
- сделать прием **других лекарств** более действенным, т.к. **очищает «засоренные»** плоховосприимчивые **рецепторы клеток** (фармрезистентность), а также **снижает побочный эффект антибиотиков** и токсичных препаратов: гипертензивных, сахароснижающих, противоэпилептических, противоаллергических, антибактериальных и прочих химиотерапевтических, кислотоснижающих лекарственных препаратов,
- улучшить **внешний вид** кожи лица: очищение проблемной кожи от прыщей.

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ОБШИРНЫ:

- острые и хронические **интоксикации** различного происхождения у взрослых и детей;
- острые **кишечные инфекции** любого генеза, включая пищевые токсикоинфекции, а также диарейный синдром неинфекционного происхождения, дисбактериоз (в составе комплексной терапии);

- **гнойно-септические заболевания**, сопровождающиеся выраженной интоксикацией;
- острые **отравления** сильнодействующим и ядовитыми веществами, в том числе лекарственными препаратами и алкоголем, алкалоидами, солями тяжелых металлов и др.;
- пищевая и лекарственная **аллергия**;
- вирусный **гепатит** и другие желтухи (гипербилирубинемия);
- хроническая **почечная недостаточность** (гиперазотемия);
- жителям экологически неблагоприятных регионов и работникам вредных производств, с целью профилактики.

КАК И СКОЛЬКО ПРИНИМАТЬ?

- **Во-первых**, Полисорб всегда принимается в виде **водной суспензии**, то есть порошок смешивается с **1\4 – 1\2 стакана воды**, и никогда не принимается сухим внутрь.
- **Во-вторых**, количество порошка для приема **зависит от массы тела**, то есть нужно знать примерный вес взрослого или ребенка, который будет его пить. Передозировки быть не может, что снимает опасения при определении дозы.

Таблица подсчета суточной дозы Полисорба в зависимости от массы тела пациента:

Вес пациента	Дозировка	Объем воды
до 10 кг	0,5-1,5 чайные ложки в сутки	30-50 мл
11-20 кг	1 чайная ложка «без горки» на 1 прием	30-50 мл
21-30 кг	1 чайная ложка «с горкой» на 1 прием	50-70 мл
31-40 кг	2 чайные ложки «с горкой» на 1 прием	70-100 мл
41-60 кг	1 столовая ложка «с горкой» на 1 прием	100 мл
более 60 кг	1-2 столовые ложки «с горкой» на 1 прием	100-150 мл

- 1 чайная ложка Полисорба «с горкой» содержит 1 грамм препарата.
- 1 грамм — наиболее рекомендуемая разовая детская дозировка.
- 1 столовая ложка Полисорба «с горкой» содержит 2,5-3 грамма препарата.
- 3 грамма — средняя разовая взрослая дозировка.

Способ применения Полисорба при основных показаниях

Заболевание	Способ применения	Особенности приема	Кол-во приемов	Длительность
Пищевая аллергия	Растворить порошок в возрастной дозе в ¼-½ стакана воды	Пить перед едой	3 раза в день	3-5 дней
Хроническая аллергия, крапивница, поллиноз, атопия	Растворить порошок в возрастной дозе в ¼-½ стакана воды	Пить перед едой	3 раза в день	10-14 дней
Отравление	Промывание желудка с 0,5-1% раствором полисорб МП (2-4 столовые ложки на 1 литр воды)	Далее –прием внутрь взвеси полисорба МП в возрастной дозе	3 раза в день	3-5 дней
Кишечные инфекции	Растворить порошок в возрастной дозе в ¼-1/2 стакана воды: 1 сутки – принимать	Прием в составе комплексного лечения	3-4 раза в день	5-7 дней

	через каждый час. 2 сутки – четыре раза в сутки по дозе.			
Вирусный гепатит	С первых дней болезни Растворить порошок в возрастной дозе в ¼-½ стакана воды	Прием в составе комплексного лечения	3-4 раза в день	7-10 дней
Очищение организма	Растворить порошок в возрастной дозе в ¼-½ стакана воды	За час до еды или через час после еды	3 раза в день	7-14 дней
Хроническая почечная недостаточность	Растворить порошок в возрастной дозе в ¼-½ стакана воды	Прием в составе комплексного лечения	3-4 раза в день	25-30 дней
Токсикоз беременных	Растворить порошок в возрастной дозе в ¼-½ стакана воды	За час до еды или через час после еды	3 раза в день	10-14 дней
Похмелье	1 сутки – принимать 5 раз в день через час. 2 сутки – принимать 4 раза в день через час.	Пить больше жидкости	1 сутки – 5 раз. 2 сутки – 4 раза.	2 дня
Профилактика похмелья	Принять по 1 дозе: до застолья, перед сном после застолья, наутро.		1 раз в день	3 дня

Редко возникают запоры, для их профилактики следует пить больше воды. Аллергические реакции возможны. При длительном приеме (более 14 дней) возможно нарушение всасывания витаминов и кальция, что корректируется приемом поливитаминов и кальция. Полисорб принимают либо за 1 час до приема лекарств/пищи, либо через 1 час после приема лекарств/пищи.

Независимо от показания препарат всегда перед применением размешивается в чистой воде комнатной температуры (количество воды и препарата варьируется от возраста).

Кроме того, допустимо использовать грудное молоко, сок без мякоти, морс или добавить в воду сок лимона и т.д.

У детей грудного возраста допустимо использовать меньший объем воды 15-25 мл (в отличие рекомендованного 30-50 мл) для размешивания препарата, а остальным объемом воды (до 50-100 мл) ребенка необходимо допить. У взрослых – перед приемом препарат размешивается в ½-1 стакане воды.


При приеме препарата стоит соблюдать повышенный питьевой режим (если нет ограничений со стороны врача) – до 2,5-3 л воды в день.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки в фазе обострения;
- Кровотечения из желудочно-кишечного тракта;
- Атония кишечника;
- Индивидуальная непереносимость препарата.


МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ПОЛИСОРБА:

1.




Вредные вещества, такие как аллергены, токсины и всевозможные патогенные бактерии провоцируют развитие заболеваний и общее ухудшение самочувствия;

2.




Полисорб, попадая в кишечник, обволакивает вредоносные бактерии и выводит их из организма;

3.



Полисорб сорбирует токсины и аллергены разных размеров, что позволяет одинаково эффективно справляться с различными отравлениями и аллергией;

4.



Полисорб выводит только вредные бактерии, сохраняя полезные микроэлементы, при применении курсом до 14 дней.

За два десятка лет Полисорб «поселился» в каждой третьей семье. Врачи хорошо знают препарат, благодаря его длительному опыту применения в России, а в последние годы в европейских и восточных странах.

Срок годности: 5 лет. Не использовать по окончании срока годности.

Условия хранения: При температуре не выше 25°C. После вскрытия упаковки хранить в плотно закрывающейся емкости. Срок хранения водной взвеси не более 48 часов. Хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска препарата:

Пакетик 3 грамма – разовая доза в удобной карманной упаковке.

Банка:

12 грамм – объем полного курса лечения для ребенка.

25 грамм – необходимое средство в домашней аптечке на любой случай для всей семьи.

50 грамм – полноценный курс лечения взрослого в экономичной упаковке.

Условия отпуска из аптек: Без рецепта.

Производитель/Адрес претензий по качеству:

АО «Полисорб», 456652, Челябинская обл., г. Копейск, ул.Томская, д.14

Тел/факс: (351) 778-51-26

Телефон бесплатной горячей линии для консультаций: 8-800-100-19-89